

UVEREJNENÉ: 5. 6. 2014

Denník KORZÁR

V rómskych osadách na východe postihla žltáčka polovicu obyvateľov

Štúdia ukázala, že aktívnu alebo prekonanú hepatitídu má 53 percent obyvateľov osád na východnom Slovensku.

KOŠICE. Alarmujúci výskyt zápalového ochorenia pečene u obyvateľov rómskych osád na východnom Slovensku preukázala lekárska štúdia.

Výskyt hepatitídy typu B je u Rómov v osadách na úrovni 12,5 percenta, aktívnu alebo prekonanú hepatitídu má dokonca 53 percent obyvateľov.

Ako v rozvojových krajinách

Výsledky štúdie o rizikových faktoroch vírusovej hepatitídy a metabolického syndrómu v populácii v 12 rómskych osadách prezentovali jej autori na sympóziu v Košiciach.

Hoci lekári očakávali vysoký výskyt rozšírenia hepatitídy B v osadách, zistené čísla ich aj tak prekvapili.

"U našich Rómov je výskyt tohto infekčného ochorenia taký ako v krajinách s najnižšou životnou úrovňou na svete," povedal novinárom hlavný koordinátor štúdie Peter Jarčuška.

Takzvaná žltáčka sa pritom môže z rómskej osady rozšíriť aj na väčšinovú populáciu.

Zlé podmienky ovplyvňujú zdravie

U Rómov štúdia zistila častejší výskyt aj metabolického syndrómu a z toho vyplývajúce väčšie kardiovaskulárne riziko.

Súčasťou štúdie bol zber údajov o socioekonomických podmienkach Rómov v osadách, ktoré Jarčuška označil za katastrofálne.

"Takmer 90 percent z nich má len základné vzdelanie, mnohí z nich nemajú prácu. Polovica z nich nemá tečúcu vodu, splachovací záchod, kúpeľňu, 20 percent nemá elektrickú energiu," konštatoval.

Zo zlých životných podmienok a nezdravého životného štýlu vyplýva aj zvýšený počet ochorení, Rómovia majú navyše horšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Už predchádzajúce štúdie ukázali, že rómski muži na Slovensku žijú v priemere o 7,5 roka kratšie a rómske ženy o 6,6 roka kratšie ako väčšinová populácia.

Dôležitá je prevencia

K zlepšeniu situácie podľa Jarčušku bude potrebná spolupráca lekárov, ako aj ďalších ľudí, ktorí môžu ovplyvniť socioekonomické aspekty života Rómov a prevenciu chorôb.

"Len taká jednoduchá vec ako očkovanie rómskej populácie vo veku od 16 do 45 rokov proti hepatitíde B by za relatívne malé peniaze znížila výskyt hepatitídy B a z toho plynúce komplikácie, ako je cirhóza pečene či rakovina pečene, ktorých liečba je extrémne náročná," dodal koordinátor štúdie.

V projekte sa tím odborníkov zameriaval na rómsku populáciu žijúcu v 12 osadách vo veku od 15 do 45 rokov. Zber údajov prebiehal ešte v roku 2011.